

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA RETEINERA

Gratuluję , właśnie zakończyłeś leczenie ortodontyczne i możesz się cieszyć pięknym uśmiechem ale , żeby efekt leczenia się utrzymał musisz nosić reteiner czyli utrwalacz .

Reteiner stały stanie się dla Ciebie nieodczuwalny po około dwóch tygodniach i nie musisz o nim pamiętać , tylko gdyby się odkleił należy niezwłocznie umówić się na wizytę aby go ponownie przykleić. Reteiner jest przez rok na gwarancji , potem naprawa lub wykonanie nowego jest płatne wg cennika.

Reteiner zdejmowany wymaga większej uwagi należy go nosić codziennie na noc przez co najmniej rok od zdjęcia aparatu a im dłużej tym lepiej.

Nie możesz go zgubić ani spróbować co się stanie jak nie będziesz go nosić , bo na pewno zęby się minimalnie przesuną , nie będziesz wtedy mógł już go prawidłowo założyć i dalsze skutki są nie do przewidzenia.

Prawidłowo założony i idealnie pasujący reteiner jest oznaką , że osiągnięty efekt leczenia ortodontycznego jest utrzymany w stu procentach.

Zęby mają tendencję do stłaczania się w ciągu całego życia , dlatego im dłuższe noszenie reteinerów , tym lepsze zabezpieczenie prostych zębów.

Reteiner zdejmowany należy myć szczoteczką do zębów i przechowywać w suchym i czystym pudełeczku .

Reteiner klejony myty jest wraz z zębami , należy tylko okresowo usuwać kamień nazębny w gabinecie stomatologicznym.

W okresie retencji należy zgłaszać się na wyznaczone wizyty kontrolne z książeczką ortodontyczną i reteinerem.

Powodzenia !

Pamiętaj że ryzyko , że zęby niekorzystnie się przesuną po leczeniu ortodontycznym zwiększa się gdy pacjent :

nie nosi reteinerów

nie zgłosi się w przypadku awarii reteinera

nie wstawi zębów po leczeniu ortodontycznym , chociaż było to pierwotnie zapisane w planie leczenia

usunie zębów lub zęby po leczeniu ortodontycznym

dalej rośnie i ma niekorzystny wzorzec wzrostu

oddycha przewlekle ustami

ma dysfunkcję języka

ma niewyrznięte zęby po zakończeniu leczenia – najczęściej ósemki